

Koper 30.05.2013

## **OPOZORILO PRIDELOVALCEM AKTINIDIJE** **Tudi v Sloveniji potrjena prisotnost bakterijskega ožiga aktinidije (Psa)**

Pridelovalce aktinidije obveščamo, da so pri Nacionalnem inštitutu za biologijo konec meseca maja 2013 tudi v Sloveniji potrdili prisotnost bakterijskega ožiga aktinidije, čigar povzročitelj je bakterija *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*. Že v preteklih letih je bila bolezen opažena v sosednji Furlaniji – Julijski krajini, v neposredni bližini naše zahodne meje. Bolezen povzroča odmiranje posameznih delov ali pogosto celih trsov, v hujših primerih tudi propad celih nasadov.

Pridelovalci aktinidije naj bodo pozorni na naslednje bolezenske znake:

- pojav temno rjavih do črnih peg nepravilnih oblik z nazobčanimi robovi na listih (Slika 2 in 3)
- nenadno venenje in sušenje poganjkov (Slika 1)
- izcedki bele do rjavo-rdeče barve (bakterijski izcedek) iz debla (Slika 4)

**Bolezenska znamenja v slikah (fotografije: G. Seljak):**



Slika 1: Propadanje okuženih trsov



Slika 2: Veneenje in sušenje poganjkov



Slika 3: Zgodnja bolezenska znamenja na deblu



Slika 4: Bakterijski izcedek na deblu



Slika 5: Rjave pege na listu



Slika 6: Sušenje okuženih cvetov

Boleznska znamenja in opis bolezni (v angleščini oz. italijanščini) si lahko ogledate tudi na spletnih naslovih:

[http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert\\_List/bacteria/P\\_syringae\\_pv\\_actinidiae.htm](http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/bacteria/P_syringae_pv_actinidiae.htm) ali

<http://www.ortoveneto.it/index.php?pagename=StampaNews&frompage=40&categoryId=13&docId=477>

Pridelovalce aktinidije pozivamo, da skrbno opazujete nasade aktinidij in v primeru sumljivih bolezenskih pojavov o tem obvezno obvestite strokovnjake Oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu v Novi Gorici na tel. 05-33-51-216 ali v Kopru na tel. 05 630 40 60 ali na elektronski naslov [entolab@go.kgzs.si](mailto:entolab@go.kgzs.si). Ti bodo nasad pregledali, po potrebi odvzeli vzorec za laboratorijsko potrditev povzročitelja in izvedli potrebne ukrepe za zaustavitev širjenja bolezni.

Izogibati se je treba nabavi sadik aktinidij z okuženih območij. Edini način zatiranja bolezni je takojšnje odstranjevanje in sežiganje obolelih delov ali celih trsov še preden se bolezen razširi. Pri rezi obolelih ali sumljivih trsov je treba sproti razkuževati orodje s 70% alkoholom ali 5% Varikino.

Pripravila:

Matjaž JANČAR in

mag. Gabrijel SELJAK