

**REGISTRIRANI FUNGICIDI V ŽITIH, 3. 5. 2016**

PRIPRAVEK	ODMER EK	UPORABA NA	K	DELUJE NA/OPOMBE
<b>ACANTO OPTI*</b> , <b>ACANTO PLUS*</b> Ciprokonazol 8% + pikoksistrobin 20%	<b>1,0 l/ha</b>	J, O, PŠ, R, T	ČU	Pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, <b>rumena rja</b> , ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ovsova rja, ržena rja, rje iz rodu Puccinia
<b>AMISTAR EXTRA*</b> Azoksistrobin 20% + ciprokonazol 8%	<b>0,6-1,0 l/ha</b>	J, O, PŠ, R, T	45 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ovsova rja, ržena rja, pšenična rja
<b>AMISTAR OPTI *</b> Azoksistrobin 8% + klorotalonil 40%	<b>2,5 l/ha</b>	J, PŠ, T	ČU	helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, <b>ječmenova ramularijska pegavost</b> , ječmenova rja, listne pegavosti iz rodu Septoria
<b>ARCHER MAX*</b> Fenopropidin 45% + propikonazol 12,5%	<b>1,0 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	42 dni	helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja
<b>ARTEA PLUS*</b> Ciprokonazol 16% + propikonazol 25%	<b>0,4-0,5 l/ha</b>	J, PŠ, T	45 dni	Pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig, ječmenova rja, pšenična rja, <b>rumena rja</b>
<b>AVOCA SUPER*</b> Ciprokonazol 4% + klorotalonil 37,5%	<b>2,0 l/ha</b>	PŠ	42 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična rja, <b>rumena rja</b> Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
<b>PROCEED *</b> Ciprokonazol 4% + klorotalonil 37,5%	<b>2,0 l/ha</b>	PŠ	42 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična rja, <b>rumena rja</b> Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
<b>BUMPER 25 EC*</b> Propikonazol 25%	<b>0,5 l/ha</b>	J, PŠ, R	35 dni	Pšenična rja, rje iz rodu Puccinia, <b>rumena rja</b> , ječmenova rja, ržena rja
<b>PROPI 25 EC*</b> Propikonazol 25%	<b>0,5 l/ha</b>	J, O, PŠ, R	35 dni	Pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, <b>rumena rja</b> , glice iz rodu Cladosporium, ječmenova rja, pepelovke iz rodu Erysiphe, ržena pepelovka, ržena rja Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
<b>CARAMBA*</b> Metkonazol 6%	<b>1,5 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenova rja, ržena rja Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
<b>DITHANE DG</b>	<b>2,0 kg/ha</b>	PŠ	14	Listne pegavosti iz rodu Septoria



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVA GORICA

## KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

### Kmetijska svetovalna služba

Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina, Slovenija  
Tel.: (++386) 5 3671072, Fax.: (++386) 5 3671073  
e-mail: anka.pozenel@go.kgzs.si, www.kmetijskizavod-ng.si

<b>Neotec*</b> , <b>MANKOZ 75 WG*</b> Mankozeb 75%			dni	
<b>DITHANE M-45*</b> Mankozeb 80%	<b>2,0 kg/ha</b>	PŠ	14 dni	Listne pegavosti iz rodu Septoria
<b>PENNCOZEB 75 DG*</b> Mankozeb 75%	<b>2,0 kg/ha</b>	PŠ	28 dni	Listne pegavosti iz rodu Septoria
<b>EMINENT 125 EW*</b> Tetrakonazol 12,5%	<b>1,0 l/ha</b>	PŠ	35 dni	Pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka Do začetka cvetenja
<b>FALCON EC 460*</b> Spiroksamin 25% + tebukonazol 16,7% + triadimenol 4,3%	<b>0,6 l/ha</b>	J, PŠ	35 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost
<b>FOLICUR EW 250*, TEBAZON EW 25*</b> Tebukonazol 25%	<b>1,0 l/ha</b>	J, O, PŠ, R	42 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, pepelovke iz rodu Blumeria. Samo ob uporabi traktorske škropilnice! Uporaba na durum pšenicah ni dovoljena.
<b>BALTAZAR*</b> Tebukonazol 25%	<b>1,0 l/ha</b>	J, O, PŠ, R	42 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pepelovke iz rodu Blumeria,
<b>ORIUS 25 EW*</b> Tebukonazol 25%	<b>1,0 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	ČU	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost Fuzarioze v ozimni pšenici tretiramo od konca klasenja do polnega cvetenja.
<b>TEBUSH A 25% EW*</b> Tebukonazol 25%	<b>1,0 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia
<b>KEYPRO*</b> Ciprokonazol 10%	<b>1,0 l/ha</b>	PŠ	35 dni	Listne pegavosti iz rodu Septoria, rje iz rodu Puccinia Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
<b>MAGNELLO*</b> Difenokonazol 10% + tebukonazol 25%	<b>1,0 l/ha</b>	PŠ	ČU	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev Sredstvo je dovoljeno uporabljati le, ko so na rastlinah prisotne pšenične listne pegavosti!
<b>MIRADOR FORTE*</b> Azoksistrobin 6% +	<b>1,5-2,0 l/ha</b>	J, PŠ, T	35 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmenova

## KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

### Kmetijska svetovalna služba

Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina, Slovenija  
Tel.: (++386) 5 3671072, Fax.: (++386) 5 3671073  
e-mail: anka.pozenel@go.kgzs.si, www.kmetijskizavod-ng.si

tebukonazol 10%				mrežasta pegavost Tretiramo do konca cvetenja.
<b>OPUS 1*</b> Epoksikonazol 8,4% + fenopropimorf 25%	<b>1,0-1,5 l/ha</b>	J, O, PR, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, lomljivost žitnih bilk, rje iz rodu <i>Puccinia</i> , žitna pepelovka. Kjer ni mogoče zagotoviti 50 m varnostnega pasu ob vodah, je uporaba stroga prepovedana.
<b>PRIAXOR EC*</b> Fluksapiroksad 7,5% + piraklostrobin 15%	<b>1,5 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, <b>rumena rja</b> , ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, <b>ječmenova ramularijska pegavost</b> , ječmenova rja
<b>PROSARO*, PROSARO 250 EC*</b> Protiokonazol 12,5% + tebukonazol 12,5%	<b>1,0 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja, rje iz rodu <i>Puccinia</i> Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
<b>RETENGO*</b> Piraklostrobin 20%	<b>1,25 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Helmintosporiozna pegavost pšenice, <b>rumena rja</b> , ržena rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, sončni ožig
<b>SEGURIUS XTRA*</b> Azoksistrobin 10% + ciprokonazol 8% + izopirazam 10%	<b>1,0 l/ha</b>	J, PŠ	35 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost, <b>ječmenova ramularijska pegavost</b> , ječmenova rja. Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
<b>SPHERE 535 SC*</b> Ciprokonazol 16% + trifloksistrobin 37,5%	<b>0,5 l/ha</b>	J, PŠ	35 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, rje iz rodu <i>Puccinia</i> , ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja
<b>TAZER 250 SC*</b> Azoksistrobin 25%	<b>0,8 l/ha</b>	J, PŠ	35 dni	Fuzarioza korenina, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja
<b>TOPSIN – M*</b> Tiofanat-metil 70%	<b>1,1 kg/ha</b>	PŠ, T	42 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice
<b>ZAMIR*</b> Prokloraz 26,7% + tebukonazol 13,3%	<b>1,5 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, steba in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVA GORICA

## KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

### Kmetijska svetovalna služba

Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina, Slovenija  
Tel.: (++386) 5 3671072, Fax.: (++386) 5 3671073  
e-mail: anka.pozenel@go.kgzs.si, www.kmetijskizavod-ng.si

<b>COSAN*</b> Žveplo 79,6%	<b>5,0-7,5 kg/ha</b>	J, R, PŠ, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe Sredstvo se uporablja preventivno.
<b>KUMULUS DF*</b> Žveplo 80%	<b>5,0-7,5 kg/h</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe Sredstvo se uporablja preventivno
<b>MICROTHIOL SC *</b> Žveplo 82,5%	<b>5-7,5 l/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Žitna pepelovka Sredstvo se uporablja preventivno
<b>MICROTHIOL SPECIAL*</b> Žveplo 80%	<b>5,0-7,5 kg/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe Sredstvo se uporablja preventivno
<b>PEPELIN*</b> Žveplo 79,6%	<b>5,0-7,5 kg/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe Sredstvo se uporablja preventivno
<b>THIOVIT JET*</b> Žveplo 80%	<b>5,0-7,5 kg/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe Sredstvo se uporablja preventivno
<b>VINDEX 80 MG*</b> Žveplo 79,6%	<b>5,0-7,5 kg/ha</b>	J, PŠ, R, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe Sredstvo se uporablja preventivno

LEGENDA: J – ječmen, O – oves, PŠ – pšenica, PR – pira, R- rž, T – tritikala, ČU – karenca  
zagotovljena s časom uporabe. FFS \* - varstvo voda, upoštevanje varnostnega pasa ob vodah  
Pripravila: A. Poženel, 3. 5. 2016