

REGISTRIRANI HERBICIDI ZA UPORABO V ŽITIH 2017 – 27. 3. 2017

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	ČAS UPORABE	UPORABA NA	DELUJE PROTI/NA	OPOMBE
ALLIANCE	Diflufenikan 60% + metsulfuron-metil 6%	65 g/ha	Jesenj: ko je 1. list prodrl skozi koleoptilo do konca razraščanja	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, ozimna rž, tritikala	Vijolica,jetičnik,mrtva kopriva,kamilica,njivska spominčica,poljski mak,rosnica,zebrat,navadna zvezdica,njivski mošnjak,navadna ogrščica,krvomočnica,plezajoča lakota,modri glavinec,navadni srakoperec	Tretiranje v brezvetru.
		100 g/ha	Spomladji: od 3. lista do konca razraščanja	Jari ječmen,jara pšenica		
ARRAT	Dikamba 50% + tritosulfuron 25%	0,2 kg/ha + močilo (DASH)	Od 3. lista do konca razraščanja	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen	Enoletni in večletni širokolistni plevel Srhkodlakavi ščir, navadni plešec, metlike, plezajoča lakota, dresni, navadna zvezdica, njivska gorjušica, bela gorjušica, perzijski jetičnik	Ne smemo uporabljati v posevkih, ki so namenjena pridelavi semen
AXIAL ONE	Florasulam 0,5% + pinoksaden 4,5%	1 l/ha	Ko so 3 listi razgrnjeni do faze, ko je viden zastavičar	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen	Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli Plezajoča lakota, kamilica, nav. plešec, nav. zvezdica, njivska spominčica, poljski mak, nav. srakoperec, ljljka, gluhi(divji) oves, lisičji rep	Preprečiti je treba zanašanje škropilne brozge na sosednje posevke
BASAGRAN, BASAGRAN 480	Bentazon 48%	2 l/ha	V fazji od razraščanja do začetka kolenčenja	Pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala	Njivska pasja kamilica, nav. plešec, ščavjelistna dresen, metlika, pasje zelišče, njivska redkev, njivski mošnjak, kamilica, bela gorjušica	Na plevel deluje v zgodnjih razvojnih fazah
BIATHLON 4D	florasulam 5,4% + tritosulfuron 71,4%	70 g/ha (za boljše delovanje lahko dodamo močilo)	Ko so 3 listi razgrnjeni do faze, ko je viden zastavičar	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen, rž, tritikala, oves,	Plezajoča lakota, pasja kamilica, kamilica, oljna ogrščica, nav. plešec, njivska redkev, njivski mošnjak, njivska gorjušica, modri glavinec, njivska spominčica, srhkodlakavi ščir, nav. ambrozija, nav. konoplja, nav. zebrat, nav. zvezdica, grašice, njivski slak	Sredstva se ne sme nanašati na oslabljene rastline. Tal se ne sme obdelovati 1 teden pred in po tretiranju

				pira		
BOXER	prosulfokarb 80%	5 l/ha	Pred vznikom, po vzniku – od razraščanja do začetka kolenčenja	Ozimna pšenica, ozimni ječmen	Enoletna latovka, ščir, pasje zelišče, nav. zvezdica, njivska spominčica, prava kamilica, enoletni golšec, krvomočnica, škrlatnordečo mrtvo koprivo injetičnike Delno zatira: nav. srakoperec, belo metliko, plezajoča lakota, dresni, njivska vijolico	Če tretiramo pred vznikom, moramo poskrbeti za dobro prekritost semen z zemljo
DUPLOSAN KV	Mekoprop-P 60%	2 l/ha	Od razraščanja do kolenčenja	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen	Nav. plešec, nav. zvezdica, gorjušice, jetičniki, plezajoča lakota, njivska redkev, poljski mak, njivska spominčica, njivska zlatica Zadovoljivo zatira: metlike, osat, njivski slak, plotni slak, modri glavinec, kamilice, nav. slakovec, njivska mrtva kopriva, dresni	Semenski plevel je najbolj občutljiv v obdobju bujne rasti, koreninski pa mora biti večji.
CERIDOR MCPA	MCPA- 75%	1 l/ha	Od 3. stranskih poganjkov do faze zastavičarja /vidna listna nožnica (BBCH 23 - 39)	Ozimna in jara Pšenica, ječmen, rž, tritikala	Sredstvo dobro zatira: navadni plešec , njivski slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), užitno rukvico , preslico ,navadno rosnico krvomočnico ,ločje, njivsko mrtvo koprivo , lucerno in koprivo . Sredstvo zaviralno deluje na: poljski mak , trpotec ,zlatico, jetičnik	
U 46 M-FLUID	MCPA- DMA-94,3%	1l/ha	Od 3. stranskih poganjkov do faze zastavičarja /vidna listna nožnica (BBCH 23 - 39)	Ozimna in jara Pšenica, ječmen, rž, tritikala	Sredstvo dobro zatira: navadni plešec , njivski slak ,užitno rukvico , preslico ,navadno rosnico ,krvomočnico ,ločje, njivsko mrtvo koprivo , lucerno in koprivo . Sredstvo zaviralno deluje na: poljski mak , trpotec, zlatico, jetičnik	

ERGON	metsulfuron-metil 6,8% + tifensulfuron-metil 68,2%	70 g/ha	2 razvita lista pšenice do faze zastavičarja	ozimna pšenica	Enoletni in večletni širokolistni pleveli (dobro delovanje, ko je plevel v fazi 2-6 listov) Nav. ogrščica, nav. plešec, nav. slakovec, bela metlika, nav. zebrat, mrtva kopriva, kamilice, poljski mak, ptičja in breskovolistna dresen, njivska gorjušica, nav. zvezdica, perzijskijetičnik	Ne na durum pšenicah. Priporočeno tretiranje v brezvetrju in v večernih urah *Kolobarne omejitve !
		60 g/ha	Pšenica od 2 razvitih listov, ječmen od 3 razvitih listov	jara pšenica, jari ječmen		
GRAN STAR SUPER 50 SX	tifensulfuron-metil 25% + tribenuron-metil 25%	60 g/ha	Od faze 7 listov do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem	Ozimni: pšenica, ječmen, rž, tritikala Jara: pšenica, ječmen, oves	Bela metlika, nav. slakovec, njivska vijolica, nav. zvezdica Zmanjšuje zapleveljenost: njivska spominčica, navadna loboda Omejeno deluje na plezajočo lakoto.	Sredstva se ne sme uporabljati, ko je posevek v stresu.
GRODYL	Amidosulfuron 75%	40 g/ha	Od faze 3 listov do začetka pojavljanja zastavičarja	Pšenica, ječmen, oves, rž, pira, tritikala	Navadni ščir, plezajočo lakoto, njivsko gorjušico, nav. slakovec, kamilice, nav. plešec, njivsko spominčico, topolistno in kodrastolistno kislico Slabše deluje na škrlatno rdečo mrtvo koprivo, njivsko vijolico, perzijskijetičnik, pasje zelišče, metlike, nav. rosnico	Za boljše delovanje dodamo močilo
HUSSAR OD	Jodosulfuron 10%	0,1 l/ha	V ozimni: od začetka razraščanja do razvoja zgornjega lista V jari: od 3. lista do konca razraščanja	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, rž, tritikala	Ozkolistni plevel: orjaška šopulja, nav. srakoperec, ljuljka, čužka, enoletna latovka, nav. latovka, Širokolistni pleveli: srhkodlakavi ščir, prava kamilica, loboda, nav. plešec, modri glavinec, bela metlika, njivski osat, zebrat, plezajoča lakota, mrtva kopriva, njivska spominčica, poljski mak, njivska redkev, njivska gorjušica, nav. zvezdica, detelja, grašica...	Najboljše rezultate doseže, ko je ozkolistni plevel v fazi 2 listov do konca razraščanja in ko je širokolistni plevel v fazi 2-6 listov

HUSSAR PLUS	jodosulfuron 5% + mezosulfuron 0,75%	0,2 l/ha	Od 3 razvitih listov do takrat, ko je 2 kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem	Ozimna: pšenica, rž, tritikala	Navadni srakoperec, ljljka, enoletna latovka, ogrščica, nav. plešec, plezajoča lakota, naceplejnolistna krvomočnica, prava kamilica, njivska spominčica, poljski mak, nav. zvezdica	S sredstvom lahko tretiramo le ob uporabi traktorske škropilnice. Ozimna žita se lahko tretira le v spomladanskem času
		0,15 l/ha	Od 3 razvitih listov do konca kolenčenja	Jara: pšenica ječmen	Gluhi oves, ogrščica, nav. plešec, bela metlika, mrtva kopriva, prava kamilica, njivska spominčica, ptičja dresen, nav. zvezdica, njivski mošnjak, perzijskijetičnik, njivska vijolica	
LINTUR 70 WG V prodaji do: 30.3.2017 V uporabi do: 30.9.2017	dikamba 65,9% + triasulfuron 4,1%	150-180 g/ha	Od 3 razvitih listov do konca razraščanja	Ozimna: pšenica, ječmen, rž, tritikala	Repnjakovec, ogrščica, plešec, koprc, gorjušica, modri glavinec, bela metlika, slak, plezajoča lakota...	Plevele tretiramo, ko imajo 4-6 listov in so v fazi hitre rasti
		120-150 g/ha	Od 3 razvitih listov do konca razraščanja	Jara: pšenica, ječmen. Tritikala in oves	Ogrščica, plešec, koprc, kamilice, osat, mrtva kopriva, njivska spominčica, nav. zvezdica	
LOGRAN 20 WG V prodaji do: 30.3.2017 V uporabi do: 30.9.2017	Triasulfuron 20%	35-40 g/ha	Tretira se do konca razraščanja žit	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, oves, rž, tritikala	Širokolistni plevel	Kolobarne omejitve! Pred setvijo je potrebno preorati vse površine
LONTREL 100	Klopiralid 10%	1-1,2 l/ha	Od začetka razraščanja do faze, ko je 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	Ozimna pšenica	Širokolistni pleveli Še posebej deluje na bodiče, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov	Kolobarne omejitve !

MEZZO	Metsulfuron-metil 20%	20-30 g/ha	Ko imajo žita vsaj 2 lista oz. ječmen vsaj 3 liste pa do faze razvijanja zastavičarja	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, tritikala in oves	Enoletni in večletni širokolistni plevel	Kolobarne omejitve!
HERBOCID V prodaji do: 1.1.2017 V uporabi do: 1.1.2018	2,4-D DMA 55,9%	1,6 l/ha	Od sredine razraščanja do začetka kolenčenja	Pšenica, ječmen, rž, tritikala	Njivska gorjušica, nav. plešec, njivski osat, metlike, njivski slak. Sredstvo ni dovolj učinkovito za zatiranje plezajoče lakote	
ESTERON	2,4-D 2-EHE 90,5%	0,75-1 l/ha	Od konca razraščanja do vidnega 2. kolanca	Ozimna in jara pšenica, ječmen, tritikala	Srhkodlakavi ščir, nav. plešec, bela metlika, osati, njivski slak, nav. rosnica, poljski mak, veliki trpotec, ptičja dresen, nav. slakovec, ščavjelistna dresen, njivska redkev, njivska gorjušica, pasje zelišče, perzijskijetičnik	
MUSTANG 306 SE	2,4-D 2-EHE 45,242% + florasulam 6,25%	0,4-0,6 l/ha	Od začetka razraščanja do 1. kolanca žita	Ozimna pšenica in ječmen, jara pšenica in ječmen	Enoletni širokolistni pleveli: metlika, dresni, nav. zvezdica, nav. kurja črevca, prava kamilica, plezajoča lakota, pelinolistna ambrozija Zmanjšuje zapleveljenost z perzijskim jetičnikom, ter njivskim osatom in slakom ter drugimi večletnimi širokolistnimi pleveli.	Zatiramo, ko ima enoletni plevel 2-6 listov
PALLAS 75 WG	Piroksulam 7,5%	120-250 g/ha + močilo (odvisno od plevela) NUfilm	Spomladi: ko imajo žita razvita 2 lista do razvojne faze drugega internodija	Ozimna in jara pšenica, rž, tritikala	Nav. zvezdica, jetičnik, nav. srakoperec, njivska pasja kamilica, nav. plešec, stoklasi, njivska gorjušica, oves, vijolica, njivski lisičji rep, plezajoča lakota, škrlatno rdeča mrtva kopriva, ljuljka	Tretiramo lahko samo z traktorsko škropilnico. Kolobarne omejitve !

SAVVY	Metsulfuron-metil 20%	30 g/ha	Ko imajo žita razvita 2 lista, ječmen 3 liste do faze zastavičarja	Jara in ozimna: pšenica, ječmen, oves, tritikala	Nav. Plahtica, nav. ogrščica, nav. plešec, bela metlika, nav. slakovec, nav. zebrat, škrlatno rdeča mrtva kopriva, kamilice, njivska spominčica, poljski mak, ptičja dresni, njivska gorjušica, nav. škrbinka, nav. zvezdica, perzijski jetičnik, vijolica	Škropilne poti se ne smejo prekrivati. Ne tretirati rastlin, ki so v stresu. Kolobarne omejitve !
SEKATOR OD	Amidosulfuron 10% + jodosulfuron 2,5%	0,5 l/ha	Od faze, ko je razvitih 5 stranskih poganjkov do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad prvim	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, rž, tritikala	Nav. plešec, glavinec, metlika, zebrat, plezajoča lakota, kamilica, poljski mak, nav. zvezdica, njivski mošnjak Zaviralno deluje proti njivskim osatom, mrtvi koprivi, vijolici, jetičniku, dresnim	Ne uporabljamo na poškodovanih posevkih.
STARANE 2, TOMIGAN 200 EC V prodaji do: 18.5.2017 V uporabi do: 18.5.2018	Fluroksipir- 1 MHE 28,8%	0,75-1 l/ha malo plevela 1- 1,5 l/ha veliko plevela 0,5 - 1 l/ha	Ko je pšenica v razvojni fazi 3 listov do pojava zastavičarja	Ozimna pšenica Jara pšenica	Širokolistni plevel: nav. slakovec, plezajoča lakota, nav. zvezdica	Ne smemo uporabljati na področjih z manj kot 2% org. snovi. Slame se ne sme uporabljati za izdelovanje komposta vrtnin

TANDUS 200 EC	fluroksipir 20%	2 l/ha	Od faze 2 razgrnjenih listov do faze nabrekanja listnih nožnic	Ozimna pšenica, ozimni ječmen (BBCH 12-31)	Nav. zvezdica, poljski mak, bršljanastolistnijetičnik, plezajoča lakota, nav. plešec, perzijskijetičnik, škrlatno rdeča mrtvakoopriva, njivska spominčica, nav. slakovec, nav. rosnica, njivska mrtva kopriva, nav. grint, kamilica, njivska gorjušica, njivski mošnjak, njivska kurja češnjica, njivskaredkev	
		1 l/ha	Od faze 2 razgrnjenih listov do faze, ko je 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	Ozimna rž in tritikala (BBCH 12-31)		
		0,75 l/ha	Od faze 2 listov do faze zastavičarja	Jara pšenica, jari ječmen (BBCH 12-39)		
		0,75 l/ha	Od 2. listov do faze, ko je 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja	Oves (BBCH 12-31)		
TBM 75 WG	Tribenuron-metil 75%	20g/ha	Od 2 razvitih listov do faze, ko je 3 kolence 2 cm nad 2. kolencem	Ozimna in jara pšenica, ječmen, oves, ozimna rž in tritikala	Nedišeča trirobka, nav. zvezdica, njivska gorjušica, nav. plešec, poljski mak, ptičja dresen. Omejeno deluje na navadno ambrozijo	Uporabljamo, ko je plevel v fazih 2-4 listov

Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI ! Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolanca, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje doseže. Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi konca razraščanja (BBCH 27 – 29), ozimni ječmeni pa v fazi začetka kolenčenja (BBCH 30 – 31). Jara žita so v fazi vznika ali razraščanja (BBCH 21 – 25). Za zatiranje plevelov je v oziminah skrajni čas, v jarinah pa je za zatiranje plevelov še čas, saj veliko semenskih plevelov zaradi suhih tal še ni vzkalilo. Po morebitnem dežju bo razvoj plevelov in posevka zelo hiter. Jarine, posebno oves, so občutljivejše na herbicide, zato je izbira in odmerjanje herbicida zelo važna. Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na razvojno fazo posevka (kolanca, zastavičar) in nočne temperature po škropljenju.