

REGISTRIRANI FUNGICIDI V ŽITIH V LETU 2017

PRIPRAVEK	ODMER EK	UPORAB A NA	K	DELUJE NA/OPOMBE
ACANTO PLUS* Ciprokonazol 8% + pikoksistrobin 20%	1,0 l/ha	J, O, PŠ, R, T	ČU	Pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, rumena rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ovsova rja, ržena rja, rje iz rodu Puccinia ACANTO PLUS: datum veljavnosti 31.10.2017
AMISTAR EXTRA* Azoksistrobin 20% + ciprokonazol 8%	0,6 - 1,0 l/ha	J, O, PŠ, R, T	45 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ovsova rja, ržena rja, pšenična rja
AMISTAR OPTI * Azoksistrobin 8% + klorotalonil 40%	2,5 l/ha	J, PŠ, T	ČU	helminosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja ječmenov listni ožig, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. ramularijska pegavost , ječmen. rja, listne pegavosti iz rodu Septoria
ARCHER MAX* Fenopropidin 45% + propikonazol 12,5%	1,0 l/ha	J, PŠ, R, T	42 dni	helminosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja
ARTEA PLUS* Ciprokonazol 16% + propikonazol 25%	0,4 - 0,5 l/ha	J, PŠ, T	45 dni	Pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig, ječmenova rja, pšenična rja, rumena rja Datum veljavnosti: 14.5.2017.
AVOCA SUPER* Ciprokonazol 4% + klorotalonil 37,5%	2,0 l/ha	PŠ	42 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična rja, rumena rja Samo ob uporabi traktorske škropilnice! Datum veljavnosti 31.10.2017.
PROCEED * Ciprokonazol 4% + klorotalonil 37,5%	2,0 l/ha	PŠ	42 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična rja, rumena rja Samo ob uporabi traktorske škropilnice! Datum veljavnosti 31.10.2017
BUMPER 25 EC* Propikonazol 25%	0,5 l/ha	J, PŠ, R	35 dni	Pšenična rja, rje iz rodu Puccinia, rumena rja, ječmenova rja, ržena rja
PROPI 25 EC* Propikonazol 25%	0,5 l/ha	J, O, PŠ, R	35 dni	Pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, rumena rja, glive iz rodu Cladosporium, ječmenova rja, pepelovke iz rodu Erysiphe, ržena pepelovka, ržena rja Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

CARAMBA* Metkonazol 6%	1,5 l/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenova rja, ržena rja Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
LIBRAX* Fluksapiroksad 6,25% + metkonazol 4,5%	1,33 – 2,0 l/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Žitna pepelovka, helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična listna rja, rumena rja, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, listne pegavosti iz rodu Septoria, pšenična listna rja
DITHANE DG Neotec*, MANKOZ 75 WG* Mankozeb 75%	2,0 kg/ha	PŠ	14 dni	Listne pegavosti iz rodu Septoria
DITHANE M-45* Mankozeb 80%	2,0 kg/ha	PŠ	14 dni	Listne pegavosti iz rodu Septoria
PENNCOZEB 75 DG* Mankozeb 75%	2,0 kg/ha	PŠ	28 dni	Listne pegavosti iz rodu Septoria
EMINENT 125 EW* Tetrakonazol 12,5%	1,0 l/ha	PŠ	35 dni	Pšenična listna pegavost, rjavjenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka Do začetka cvetenja
FALCON EC 460* Spiroksamin 25% + tebukonazol 16,7% + triadimenol 4,3%	0,6 l/ha	J, PŠ	35 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavjenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost
FOLICUR EW 250* Tebukonazol 25%	1,0 l/ha	J, O, PŠ, R	42 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, pepelovke iz rodu Blumeria. Samo ob uporabi traktorske škropilnice! Uporaba na durum pšenicah ni dovoljena.
BALTAZAR* Tebukonazol 25%	1,0 l/ha	J, O, PŠ, R	42 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pepelovke iz rodu Blumeria,
ORIUS 25 EW* Tebukonazol 25%	1,0 l/ha	J, PŠ, R, T	ČU	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost Fuzarioze v ozimni pšenici tretiramo od konca klasenja do polnega cvetenja.
STAR TEBUKONAZOL* Tebukonazol 25%	1,0 l/ha	J, O, PŠ, R	42 dni	Ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pepelovke iz rodu Blumeria, fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, žitna pepelovka

TEBUSA 25% EW* Tebukonazol 25%	1,0 l/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia
KEYPRO* Ciprokonazol 10%	1,0 l/ha	PŠ	35 dni	Listne pegavosti iz rodu Septoria, rje iz rodu Puccinia Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
MAGNELLO* Difenokonazol 10% + tebukonazol 25%	1,0 l/ha	PŠ	ČU	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev Sredstvo je dovoljeno uporabljati le, ko so na rastlinah prisotne pšenične listne pegavosti!
COMRADE* Azoksistrobin 20% + ciprokonazol 8%	0,75 l/ha	J, PŠ	42 dni	Pšenična rja, rumena rja, pšenična listna pegavost. Samo ob uporabi traktorske škropilnice! Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se površina posuši.
MIRADOR FORTE* Azoksistrobin 6% + tebukonazol 10%	1,5 - 2,0 l/ha	J, PŠ, T	35 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost Tretiramo do konca cvetenja.
OPUS 1* Epoksikonazol 8,4% + fenopropimorf 25%	1,0 - 1,5 l/ha	J, O, PR, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, lomljivost žitnih bilk, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka. Obvezno zagotoviti 50 m varnostnega pasu ob vodah!
PRIAXOR EC* Fluksapiroksad 7,5% + piraklostrobin 15%	1,5 l/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, rumena rja, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost , ječmenova rja
PROSARO*, PROSARO 250 EC* Protiokonazol 12,5% + tebukonazol 12,5%	1,0 l/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja, rje iz rodu Puccinia, Samo ob uporabi traktorske škropilnice! PROSARO 250 EC zaloge v uporabi do 30.6.2017!
ZANTARA* Biksafen 5% + tebukonazol 16,6%	1,5 l/ha	J, PŠ, R, T, O	35 dni	Pšenična pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, temna pegavost pšenice, fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, rženi listni ožig, listna pegavost ječmena, ječmenova ramularijska pegavost , ovsova rja Vstop na tretirano površino je dovoljen 4 dni po tretiranju.

RETENGO* Piraklostrobin 20%	1,25 l/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Helmintosporiozna pegavost pšenice, rumena rja, ržena rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmen. rja, sončni ožig
SEGURIUS XTRA* Azoksistrobin 10% + ciprokonazol 8% + izopirazam 10%	1,0 l/ha	J, PŠ	35 dni	Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenič. rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmen. mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost , ječmenova rja. Samo ob uporabi traktorske škropilnice!
SPHERE 535 SC* Ciprokonazol 16% + trifloksitrobin 37,5%	0,5 l/ha	J, PŠ	35 dni	Pšenič. listna pegavost, pšenična pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmen. listni ožig, ječmen. pepelovka, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. rja Datum veljavnosti 31.7.2017
TAZER 250 SC* Azoksistrobin 25%	0,8 l/ha	J, PŠ	35 dni	Fuzarioza korenina, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšenič. plev, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. rja
TOPSIN – M* Tiofanat-metil 70%	1,1 kg/ha	PŠ, T	42 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice
ZAMIR* Prokloraz 26,7% + tebukonazol 13,3%	1,5 l/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Fuzarioza korenin, stebila in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja
COSAN* = VINDEX 80 MG* Žveplo 79,6%	5,0- 7,5 kg/ha	J, R, PŠ, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe (žitna pepelovka), za EKO Sredstvo se uporablja preventivno.
KUMULUS DF* = THIOVIT JET* Žveplo 80%	5,0- 7,5 kg/h	J, PŠ, R, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe, za EKO Sredstvo se uporablja preventivno
MICROTHIOL SC* Žveplo 82,5%	5- 7,5 l/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Žitna pepelovka Sredstvo se uporablja preventivno za EKO
MICROTHIOL SPECIAL* Žveplo 80%	5,0 - 7,5 kg/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe Sredstvo se uporablja preventivno za EKO
PEPELIN* Žveplo 79,6%	5,0- 7,5 kg/ha	J, PŠ, R, T	35 dni	Pepelovke iz rodu Erysiphe, za EKO Sredstvo se uporablja preventivno

LEGENDA: J – ječmen, O – oves, PŠ – pšenica, PR – pira, R- rž, T – tritikala, ČU – karencja zagotovljena s časom uporabe. FFS * - varstvo voda, upoštevanje varnostnega pasa ob vodah, za EKO – dovoljen v ekološki pridelavi; Pripravila: A. Pozenel, 3. 5. 2017