

**SEZNAM HRBICIDOV PO VZIKU KORUZE 2017**

**SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 3. 5. 2017**

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE NA, UPORABA	OPOMBE
<b>BROMOTRIL 225 EC</b> bromoksinil oktanoat	<b>1 – 1,5 l/ha</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze za širokolistne semenske plevele	po vzniku posevka, <b>za ambrozijo</b>
<b>AKRIS *</b> Dimetenamid+ terbutilazin	<b>3 l/ha</b>	Od 2. do 6. Lista koruze Za enoletne ozko in širokolistne plevele Datum veljavnosti 31.10.2017	
<b>CAMBIO *</b> bentazon + dikamba	<b>2 l/ha</b> lahko dodamo <b>MOČILO</b>	v fazi 2 – 7 listov, za širokolistne (enoletne in večletne) plevele	dobro deluje na slak in osat, <b>za ambrozijo</b> Datum veljavnosti 30.6.2017
<b>BASAGRAN 480*</b> , <b>BASAGRAN</b> bentazon	<b>1,5 – 2 l/ha</b>	V fazi 1 – 5 listov koruze za širokolistne semenske	Ne deluje na slak
<b>HERBOCID</b> 2,4-D DMA	<b>1 – 1,5 l/ha</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze oz. 15- 20 cm za širokolistne plevele, slak osat, <b>za ambrozijo.</b>	lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi. Zaloge v prodaji do 1.7.2017. Zaloge v uporabi do 1.7.2018
<b>ESTERON</b> 2,4 D 2-EHE	<b>1 l/ha</b>	pri fazi 4 – 6 list koruze za širokolistne plevele, <b>za ambrozijo</b>	
<b>MUSTANG 306 SE</b> 2,4-D 2-EHE + florasulam	<b>0,5 – 0,6 l/ha</b>	do 4 – 5 lista koruze, za širokolistne plevele, slak in osat, <b>za ambrozijo</b>	
<b>ELUMIS *</b> mezotrion –7,5% + Nikosulfuron – 3%	<b>Do 1,5 l/ha</b>	Po vzniku od 2-8 listov koruze, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla. Datum veljavnosti 31.7.2017	
<b>LAUDIS</b> tembotrion 4,4 %	<b>1,15 – 2,25 l/ha</b>	Za širokolistne in nekatero ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom Omejitev pri kolobarju! Datum veljavnosti 31.12.2017
<b>LAUDIS WG 30</b> tembotrion 20 %	<b>0,25 – 0,5 kg/ha + močilo</b>	Za širokolistne in nekatero ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom , Omejitev pri kolobarju! Datum veljavnosti 31.12.2017

<b>LONTREL 100</b> * Klorpiralid	<b>1 – 1,2</b> <b>l/ha</b>	za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista	osat, <b>pelinol.ambrozija</b> , kamilice in slak. Omejitve pri kolobarju
<b>PEAK 75 WG</b> prosulfuron	<b>20 – 30</b> <b>g/ha</b> <b>+ močilo</b>	širokolistni pleveli, slak, kislice in osat  datum veljavnosti 30.6.2017	
<b>STARANE 2 ali</b> <b>TOMIGAN 200</b> <b>EC</b> - fluroksipir 1-MHE 28,8 %	<b>0,8 l/ha</b>	v fazi 3 – 6 listov, za nekatero širokolistne plevele (kislice,robide)	Tudi slak , robido NE na kraških območjih ! STARANE 2 in TOMIGAN 200 EC: Zaloge v prodaji do 18.5.2017, zaloge v uporabi do 18.5.2018
<b>STARANE</b> <b>FORTE</b> Fluroksipir 33,3%	<b>0,54 L/ha</b>	V fazi 2-6 listov koruze Za širokolistne plevele: plezajoča lakota, breskova dresen, navadna zvezdica, rogovilček, njivski slak.	Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koruza 30- 100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika.  Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.
<b>TANDUS 200</b> <b>EC ali GAT</b> <b>STAKE EC</b> fluroksipir 20%	<b>1 l/ha</b>	v fazi 3 – 6 listov, za nekatero širokolistne plevele (kislice,robide)	Tudi slak  GAT STAKE EC zaloge v uporabi do 12.1.2018
<b>BANVEL 480 S</b> * <b>BANVEL 4 S</b> Dikamba -48 %	<b>0,6 l/ha</b>	<b>za širokolistne</b> <b>(enoletne in</b> <b>večletne)</b> pri fazi 2 – 8 list koruze	dobro deluje na slak, <b>za</b> <b>ambrozijo</b> BANVEL 4 S: zaloge v uporabi do 15.8.2017
<b>KALIMBA,</b> <b>DICASH</b>  Dikamba- 48 %	<b>0,6 l/ha</b>	Za zatiranje širokolistnega plevela <b>V fazi od 2. do 8 lista</b> <b>koruze, najboljše od 3</b> <b>– 5 lista koruze</b>	Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28°C, <b>za ambrozijo</b>
<b>ARRAT *</b> Dikamba - 50 % Tritosulfuron - 25%	<b>0,2 kg/ha</b>	od 2 – 8 listov koruze  Za širokolistne plevele	Tudi na slak, <b>za ambrozijo.</b> Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha
<b>ALISEO*</b> Nikosulfuron 30% + rimosulfuron-5%	<b>70 g/ha</b> <b>+ močilo</b>	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele

<b>ALISEO PLUS</b> * Dikamba+ Nikosulfuron + Rimosulfuron	<b>350 – 440 g/ha + močilo</b>	Od 2. do 6. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele
<b>ARIGO</b> Mezotrion + Nikosulfuron + rimosulfuron	<b>330 g/ha + močilo</b>	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele Datum veljavnosti 31.7.2017
<b>HARMONY 75 WG</b> tifensulfuron - metil	<b>10 – 15 g/ha + močilo</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze, za zatiranje širokolistnih plevelov	tudi za ščir in metlike. Zaloge v uporabi 23.10.2017
<b>HARMONY 50 SX</b> tifensulfuron - metil	<b>22,5 g/ha + močilo</b>	pri fazi 2 – 8 listov koruze, za zatiranje širokolistnih plevelov	tudi za ščir in metlike. Datum veljavnosti 1.11.2017
<b>EQUIP</b> Foramsulfuron- 2,25%	<b>2 – 2,5 l/ha Močilo je že dodano!</b>	za travne in enoletne širokolistne plevele; v fazi 2 – 6 listov koruze	tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pirnica, <b>za ambrozijo</b> . Datum veljavnosti 31.7.2017
<b>MAISTER OD</b> Foramsulfuron- 3% jodosulfuron.- metil natrij- 1%	<b>1,5 l/ha</b>	ozkolistni in širokolistni pleveli v  fazi 2 – 6 listov koruze	tudi za slak, <b>za ambrozijo</b>
<b>TAROT 25 WG</b> * rimisulfuron 25 %	<b>50 – 60 g/ha + močilo</b>	<b>Od 2. do 8. lista koruze za travne plevele</b> in nekatere širokolistne, divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon	
<b>MOTIVELL*</b> <b>ali</b> <b>SAMSON 4 SC*</b> <b>ali BANDERA *</b>  <b>Nikosulfuron – 4%</b>	<b>1 l/ha</b>	<b>za travne plevele</b> tudi divji sirek, pirnica, kostreba in <b>za nekat. enoletne širokolistne plevele</b> 3 – 8. list koruze	ne deluje na slak za ščir,  V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevele
<b>KELVIN* ali KELVIN OD*</b> <b>Nikosulfuron – 4%</b>	<b>1l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele, 3 – 6. list koruze	
<b>NICOSH* ali PRIMERO*</b> <b>Nikosulfuron – 4%</b>	<b>1l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele, 3 – 6. list koruze	

<b>SAMSON EXTRA 6 OD*</b> ali <b>MILAGRO EXTRA 6OD*</b> ali <b>MOTIVELL EXTRA 6 OD*</b> Nikosulfuron – 6%	<b>0,75 l/ha</b>	<b>Po vzniku od 2-8 listov koruze</b> , za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči in za nekatere enoletne širokolistne plevele. Ne uporablja se jih v sladki koruzi	
<b>ENTAIL*</b> ali <b>MILAGRO 240 SC*</b> Nikosulfuron – 24%	<b>0,17 l/ha</b>	<b>Po vzniku od 2-8 listov koruze</b> , selektivnost za koruzo je najboljša <b>od 3- 5 lista koruze</b> za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevla	
<b>CALLISTO TURBO</b> Dikamba + mezotrion +nikosulfuron	<b>0,45 kg/ha ali deljeno 0,4 kg/ha + 0,2 kg/ha</b>	Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevla V fazi od 2 do 9 lista koruze	Delno zatira njivski slak Datum veljavnosti 31.7.2017
<b>CLIOPHAR 600 SL</b> klopiralid	<b>0,16-0,2 l/ha</b>	Za zatiranje širokolistnega plevla V fazi od 2 do 5 listov koruze	Dobro zatira kamilico, osate
<b>MONSOON ACTIVE</b> Foramsulfuron + tienkarbazon-metil	<b>1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	Mogoča deljena aplikacija Uporaba v fazi od 2-6 list koruze
	<b>2 l/ha ali 1 + 1 l/ha</b>	Divji sirek	Datum veljavnosti 31.7.2017
<b>OSORNO, TEMSA SC</b> mezotrion	<b>1,5 l/ha</b> Uporaba v fazi od 2 do 8 listov na koruzi	<b>Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevla</b> , njivske vijolice, plezajoče lakote in nav. slakovec	<b>OSORNO IN TEMSA SC</b> datum veljavnosti 31.7.2017
<b>CAPRENO</b> tembotrion + tienkarbazon-metil	<b>0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja</b>	Zatira dresni, belo metliko, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec	<b>Uporaba v fazi 2-6 pravih listov.</b> Sredstvo lahko uporabimo samo 1x v rastni dobi.

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;  
 Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 3.5..2017, MKGP, URSVHVVR