

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2017

**KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED
 KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 17.5.2017**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	DELUJE NA ALTERNARIO
ANTRACOL = ANTRACOL WG 70	propineb 70%	2,5 kg/ha	14 dni	DA
BANKO 500 SC	klorotalonil 50%	2 l/ha	8 dni	NE
DITHANE DG 250 Neotec == MANKOZ 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
DITHANE M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	DA
ENERVIN	ametoktradin 12% + metiram 44%	2 kg/ha	7 dni	NE
MANFIL 75 WG	mankozeb 75%	2 kg/ha	7 dni	DANE
MANFIL 80 WG == PINOZEB M-45	mankozeb 80%	2 kg/ha	7 dni	NE
PENNCOZEB 75 DG	mankozeb 75%	1,7 kg/ha	7 dni	NE
POLYRAM DF	metiram 70%	2 kg/ha	21 dni	NE
RANMAN TOP	ciazofamid 16%	0,5 l/ha	7 dni	NE
RANMAN TWINPACK	ciazofamid 40%	0,2 l/ha + močilo	7 dni	NE
SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE	fluazinam 50%	0,4 l/ha	7 dni	NE

**SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED
 KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 17.5.2017**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	DELUJE NA ALTERNARIO
ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG	dimetomorf 9% + mankozeb 60%	2 kg/ha	7 dni	DA
ELECTIS 75 WG	mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%	1,5 - 1,8 kg/ha	7 dni	NE
GALBEN M	benalaksil 8% + mankozeb 65%	2,5 kg/ha	28 dni	NE
INFINITO	fluopikolid 6,25 % +propamokarb 62,5 %	1,2 - 1,6 l/ha	7 dni	NE
MELODY DUO WG 66,8	iprovalikarb 5,5% + propineb 61,3%	2,5 kg/ha	14 dni	NE
ANTRACOL COMBI WP 62,8	cimoksnil 4,8% + propineb 58%	2,5 kg/ha	14 dni	NE
MOXIMATE 725 WG == MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS == PROFILUX	cimoksnil 4,5% + mankozeb 68%	2,5 kg/ha	7 dni	NE
CYMBAL	cimoksnil 45%	0,2 0– 0,25 kg/ha	7 dni	NE
NAUTILE DG	cimoksnil 5% + mankozeb 68%	2 kg/ha	7 dni	NE
NAUTILE WP	cimoksnil 4,5% + mankozeb 65%	2,25 kg/ha	21 dni	NE
EQUATION PRO	cimoksnil 30% + famoksadon 22,5%	400 g/ha	14 dni	NE
BANJO FORTE	dimetomorf 20% + fluazinam 20%	1 l/ha	7 dni	NE

ORVEGO	ametoktradin 30% + dimetomorf 22,5%	0,8 l/ha	7 dni	NE
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%	2,5 kg/ha	21 dni	NE
GETT == PERGADO MZ	mandipropamid 5% + mankozeb 60%	2,5 kg/ha	7 dni	DA
REVUS	mandipropamid 25%	0,4 - 0,6 l/ha	3 dni	NE
TANOS 50 WG	cimoksanil 25% + famoksadon 25%	0,7 kg/ha	14 dni	NE
SACRON 45 DG	cimoksanil 45%	0,22 kg/ha	14 dni	NE
CURZATE C EXTRA	baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%	2 kg/ha	28 dni	NE

**KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA
 ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 17.5.2017**

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	DELUJE NA ALTERNARIO
BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS	baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata 35%	4-5 l/ha	14 dni	NE
CUPRABLAU Z 35 WP	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,8 kg/ha	14 dni	DA
CUPRABLAU Z 35 WG	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	2,1 kg/ha	14 dni	NE

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;
 Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 3.5..2017, MKGP, URSVHVVR