

SEZNAM HRBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU 2017

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PRED VZNIKOM oz. TIK PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 5.5. 2017

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE
STOMP AQUA Pendimetalin -45,5%	3,3 l/ha	Pred vznikom in do 4. lista koruze in velikosti plevelov do 2 lista, deluje na travne plevela in nekat. širokolistne plev	Ob uporabi sredstva naj bodo tla vlažna. Tal se ne sme obdelovati 3-5 tednov, se ga ne sme zadeti ! datum veljavnosti 31.7.2017
ACTIVUS 40 WG Pendimetalin -40%	4 kg/ha	pred vznikom in takoj po vzniku koruze, deluje na travne in na nekatere širokolistne plevela	ne smemo ga uporabiti v času vznika koruze, seme mora biti dobro pokrito
SHARPEN 40 SC	2,5 – 4 l/ha		SHARPEN 40 SC datum veljavnosti 31.7.2017
SHARPEN 33 EC Pendimetalin -33%	3 – 5 l/ha	po setvi, vendar pred vznikom koruze za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela	Slabo zatira slak Datum veljavnosti 31.7.2017
FRONTIER X2 * dimetenamid - P	1 – 1,4 l/ha	tretiramo pred ali po vzniku koruze, pred vznikom plevelov, deluje na enoletne travne plevela, delno na širokolistne (ščir),	uporaba na lahkih tleh z malo org. snovi in na Krasu prepovedana ! Boljši v kombinaciji. Datum veljavnosti 31.10.2017
DUAL GOLD 960 EC * metolaklor-s 96 %	1 – 1,5 l/ha pred vznikom 1– 1,3l/ha po vzniku	pred in po vzniku do 2. listov koruze; enoletni ozkolistni, delno širokolistni	ni za kislja tla pod pH 5,2 Na VVO le po vzniku posevka
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC * metolaklor-s +terbutilazin	4 – 4,5 l/ha	travnji in širokolistni pleveli pred in po vzniku do 2. lista koruze	ni za vodozbirna območja, oz. le po vzniku posevka. Učinkovito zatira ambrozijo.
KOBAN TX Petoksamid + terbutilazin	4 l/ha	Širokolistni in ozkolistni pleveli Pred in po vzniku do 4. lista koruze	Slabo deluje na slak
MERLIN FLEXX Izoksafutol 24 %	0,3 l/ha – pred vznikom 0,4 l/ha po vzniku	Po vzniku do največ 3. lista koruze enoletni širokolistni pleveli, nekateri enoletni ozkolistni pleveli	seme mora biti dobro pokrito

TERANO WG 62,5 * Flufenacet+metosulam	1 kg/ha Po vzniku dodamo MOČILO!	Pred in po vzniku koruze do 3 listov, deluje na enoletne travne in nekatere širokolistne plevela	dobro deluje na preslico, če je veliko travnih plevelov dodamo graminicid Zaloge v prodaji do 22.6.2017, zaloge v uporabi 22.6.2018
SUCCESSOR 600 PRO *, SUCCESSOR 600* petoksamid- 60%	2 l/ha	pred in po vzniku koruze do 4. lista, deluje na travne in širokolistne plevela	potrebna zadostna talna vlaga
LUMAX * mezotrion+metolaklor- s + terbutilazin	3 – 4 l/ha	Pred vznikom do največ 4. lista koruze, za zatiranje enoletnih širokolistnih in travnih plevelov	Pred vznikom izven VVO, nižji odmerki na lahkih tleh. Učinkovito zatira ambrozijo . Datum veljavnosti 31.7.2017
ADENGO, ADENGO 315 SC Izoksaflutol+ tienkarbazon metil	0,44 l/ha	Pred ali po vzniku koruze do 3.lista koruze Enoletni široko in ozkolistni pleveli	Zatira lobodo, metliko,dresni – ščavje, pasje zelišče, muhvič, kostrebo, srakonjo,.. Datum veljavnosti 31.7.2017
CALLISTO 480 SC mezotrion -48%	0,25– 0,3 l/ha pred vznikom 0,15 – 0,25 l/ha po vzniku + močilo	Pred in po vzniku do faze 8 listov pri koruzi, za zatiranje širokolistnih plevelov	tudi za zatiranje navadne kostrebe, tudi preslice in ambrozijo
CAMIX * Mezotrion+ S-metaloclor	3,75 l/ha (pri močni zaplevljenosti dodamo MOČILO)	Pred in po vzniku do faze 2. lista koruze, za zatiranje enoletnih travnih in širokolistnih plevelov	Varnostni pas ob vodah 1. in 2. reda je 20 m !
BORDER 480 SC* Mezotrion – 48%	0,3 L/ha pred vznikom 0,2-0,25 L/ha po vzniku + močilo	Za zatiranje srhodlakavi ščir,, plezajoča lakota, navadni slakovec in navadna kostreba. Po vzniku uporaba do faze 2 razvitih listov koruze.	Tretiranje največ 1x v rastni dobi. Ob stresu povzroči prehodne kloroze. Datum veljavnosti 31.7.2017

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;
 Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 3.5.2017, MKGP, URSVHVVR