

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

Oddelek za varstvo rastlin

Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija
Tel.: (++386) 5 6304060, Fax.: (++386) 5 6304062
e-mail: matjaz.jancar@go.kgzs.si, www.kmetijskizavod-ng.si

Nova Gorica, Koper 20.04.2012

OPOZORILO PRIDELOVALCEM AKTINIDIJE NA PRIHAJAJOČO NEVARNOST – BAKTERIJSKI OŽIG AKTINIDIJE –

Pridelovalce aktinidije opozarjamo, da so v Italiji opazili močnejši pojav bakterijskega ožiga aktinidije, čigar povzročitelj je bakterija *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*. Bolezen se že pojavlja v sosednji Furlaniji – Julijski krajini v Italiji, zato je velika nevarnost, da se razširi ali zanese tudi v Slovenijo zlasti na Primorsko, kjer je aktinidij več. Bolezen povzroča odmiranje posameznih delov ali pogosto tudi celih trsov ter včasih tudi propad celih nasadov.

Pridelovalci aktinidije naj bodo pozorni na naslednja bolezenska znamenja:

- nenadno venenje in sušenje poganjkov, ki mu sledi postopno sušenje rozg ali celih trsov (sl. 1)
- pojav temno rjavih peg nepravilnih oblik z nazobčanimi robovi na listih (sl. 2).
- izcedki rjavo-rdeče barve (bakterijski izcedek) iz debla (sl. 3)

Bolezenska znamenja v slikah:



Slika 1: Venenje poganjkov in cvetov



Slika 2: Drobne rjave pege na listih



Slika 3: Bakterijski izcedek na rozgah in deblu:

Slikovni vir: *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*: The causal agent of bacterial canker of kiwifruit. Z dovoljenjem: Italian Plant Protection Organization.

Bolezenska znamenja in opis bolezni (v angleščini oz. italijanščini) si lahko ogledate tudi na naslovih:

http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/bacteria/P_syringae_pv_actinidiae.htm ali

<http://www.ortoveneto.it/index.php?pagename=StampaNews&frompage=40&categoryId=13&docId=477>

Pridelovalce aktinidije pozivamo, da skrbno opazujete nasade aktinidij in v primeru sumljivih bolezenskih pojavov o tem obvezno obvestite strokovnjake Oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu v Novi Gorici na tel. 05-33-51-216 ali na elektronski naslov entolab@go.kgzs.si. Ti bodo nasad pregledali, po potrebi odvezeli vzorec za laboratorijsko potrditev povzročitelja in izvedli potrebne ukrepe za zaustavitev širjenja bolezni.

Izogibati se je treba nabavi sadik aktinidij z okuženih območij. Edini način zatiranja bolezni je takojšnje odstranjevanje in sežiganje obolelih delov ali celih trsov še preden se bolezen razširi. Pri razi obolelih ali sumljivih trsov je treba razkuževati orodje s 70% alkoholom ali 5% Varikino. V primeru pojava te hude bolezni aktinidije pri nas bodo pripravljena dodatna navodila za ukrepanje.

Pripravila:

Matjaž JANČAR in
mag. Gabrijel SELJAK