



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Datum: 27/06/2011

Napotki za varstvo vinske trte z dne 27. junija 2011

OBVEZNO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na razmejenem območju v vinorodni deželi Primorska, bo od četrтка 30.6.2011 dalje čas, da v vseh proizvodnih vinogradih, v matičnih vinogradih in matičnjakih izvedemo **drugo tretiranje** proti **ameriškemu škržatku**, ki je glavni naravni prenašalec izjemno nevarne **zlate trsne rumenice**. Ukrep je **obvezen** (!) za vse imetnike vinogradov na okuženem območju oziroma razmejenem območju (**Slovenska Istra, pet kilometrski pas okoli žarišča na Vogrskem v Spodnji Vipavski dolini**) in na ogroženih območjih (**Zgornja Vipavska dolina zaradi trsničarstva in velike številčnosti ameriškega škržatka na tem območju**). Natančen zemljevid okuženih območij dobite na spletni strani FURS-a (http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Rumenice/RumenicePosObv/RumenicePosObv_razmejena_karta.asp)

Če je na okuženem območju oziroma razmejenem območju potrebno sočasno zatiranje **grozdnih sukačev** je v tem času najbolj smiselna uporaba pripravka **RELDAN 22 EC** (smemo ga uporabiti le enkrat v sezoni).

Pripravek **RELDAN 22 EC** lahko v količini **1,6 l/ha** uporabljajo le vinogradniki, katerih vinogradi se nahajajo na razmejenih in ogroženih območjih in v katerih je zagotovljen varnostni pas **75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda**.

Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede **75 m varnostnega pasu**, lahko ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanosa (antidrift šobe) le tega uporabijo pod pogoji, kot so navedeni.

Tip antidriftne šobe	varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda (v metrih)
90 % zmanjšanje zanosa FFS	15 m
75 % zmanjšanje zanosa FFS	30 m
50 % zmanjšanje zanosa FFS	40 m

Imetniki vinogradov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede **75 m varnostnega pasu** imajo pa možnost uporabe antidriftnih šob, morajo pred uporabo sredstva **RELDAN 22 EC** v količini **1,6 l/ha**, prigrasiti uporabo sredstva pooblaščenemu izvajalcu varstva rastlin KGZS Zavod NG (E-mail: ivan.zezlina@go.kgzs.si; gabrijel.seljak@go.kgzs.si; andrej.murenc@go.kgzs.si; branko.carlevaris@go.kgzs.si;

Izven okuženih oziroma razmejenih območij, za zatiranje **grozdnih sukačev** uporabljamo sredstvo **RELDAN 22 EC** v količini **1,0 l/ha**.

Če zatiranje grozdnih sukačev ni potrebno lahko ponovno uporabimo sredstvo **ACTARA** v količini **200 g/ha** ali **DECIS 2,5 EC** v količini **0,5 l/ha**.

Ker je zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih in ogroženih območjih karantenski ukrep, so ga dolžni zatirati tudi vinogradniki, ki imajo ekološko pridelavo grozdja. Za ta namen so registrirana

sredstva na osnovi naravnega piretrina (KENYATOX VERDE, FLORA VERDE in VALENTIN EKO insekticid) v količini 0,8 L/ha.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina